


**Mond
Kaak
Aangezichtschirurgie**
Midden Nederland

Spalken losgeraakte tand

MKA Chirurgen:

Philip Broers (*kaakchirurg*)

Erwin Kruizinga (*kaakchirurg, implantoloog**)

Carla Robben (*kaakchirurg*)

Jan Willem de Ruiter (*kaakchirurg, implantoloog**)

Márton Vidra (*kaakchirurg, implantoloog**)

Albert Wittkamp (*kaakchirurg, oncoloog*)

* NVOI geregistreerd



Spalken losgeraakte tand.

Vandaag is een losgeraakte tand bij u vastgezet met een spalk. De spalk is bedoeld om de tand stevig op zijn plaats te houden, zodat de tand weer kan vastgroeien. De spalk moet ongeveer vier tot zes weken blijven zitten.

Wanneer de tand op de grond heeft gelegen, geven wij uit voorzorgen injectie tegen wondkramp (tetanus).

Pijn

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende middelen, waarvoor u een recept hebt meegekregen. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Zwelling

Door het ongeluk kunnen de wangen en lip flink gaan opzwellen. De zwelling is het grootst na twee dagen en wordt dan vanzelf weer minder om tenslotte helemaal te verdwijnen. Deze zwelling is moeilijk te voorkomen. Omdat de zwelling niet door een infectie wordt veroorzaakt, is antibiotica meestal niet nodig.

Verdere verzorging.

De tand staat nu door de spalk weer goed vast, maar u moet de eerste weken nog voorzichtig zijn. U mag er niets mee afbijten en niet op potloden en dergelijke bijten. U mag ook geen kauwgom kauwen.

Kortom: de tand moet zoveel mogelijk worden ontzien. Hij mag niet belast of bewogen worden om het vastgroeien niet te verstoren.

Schoonhouden van de tanden en kiezen is noodzakelijk. In een schone mond is de kans geringer dat de losgeraakte tand alsnog door een ontsteking weer verloren gaat. U kunt het beste poetsen met een kleine zachte tandenborstel en fluoriedehoudende tandpasta. Maak een korte heen- en weergaande beweging en pas op dat u niet te veel druk uitoefent op de losgeraakte tand.

Spoel de mond na met water. Spoel hierna gedurende 1 minuut met chloorhexidine 0,2% mondspoeling (Corsodyl of Perio-AID). U heeft hiervoor van ons een recept meegekregen. Poets na iedere maaltijd en spoel 3 maal per dag met de mondspoeling. Na het spoelen uitspugen en niet naspoelen met water. Minimaal 30 minuten niet eten of drinken om de werking van de chloorhexidine optimaal te houden. Wanneer de chloorhexidine mondspoeling langere tijd wordt gebruikt, kan er verandering van smaak en verkleuring van tanden en kiezen optreden. Dit is een tijdelijk effect en verdwijnt wanneer u stopt met spoelen.

Controle.

Het vastgroeien van de tand zal door ons regelmatig worden gecontroleerd. Door het ongeval kan de zenuw van de tand of kies dood gaan. Wij raden u aan om bij de tandarts een afspraak te maken om de tand te laten controleren. Wanneer de zenuw is doodgegaan kan de tandarts de tand van binnen schoonmaken (wortelkanaal behandeling).

Tenslotte.

Als na vier tot zes weken de spalk verwijderd wordt, is de tand meestal weer voldoende vastgegroeid. Soms echter blijkt na enige maanden of langer, dat de wortel van de losgeraakte tand gaat oplossen. Dit betekent dat na verloop van tijd de tand verloren gaat.

Het kan twee tot vier jaar duren voordat de wortel zover is opgelost, dat de tand uitvalt.

Als er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid, is het nuttig de verzekering van de tegenpartij tijdig mee te delen dat zij ook aansprakelijk is voor de late gevolgen van het ongeval. In dit geval dus het verloren gaan van de losgeraakte tand en de vervanging door een kunststand.

Wanneer bellen?

Als de zwelling of de pijn na drie dagen erger wordt in plaats van minder, is het verstandig om contact met ons op te nemen.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen wanneer u vragen hebt of als u zich ongerust maakt.

De telefoonnummers staan vermeld op uw ziekenhuiskaart in het mapje van de ponskaart. Voor spoedgevallen kunt u het algemene telefoonnummer van ziekenhuis bellen,

Lees ook onze speciale nazorg folder!

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:

Maatweg 3,
3813 TZ Amersfoort
Tel. Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:

Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911 Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamiddennederland.nl